

Mujeres menores de 35 años con cáncer de mama: Asociación entre la edad y el tamizaje mamario (Resultados preliminares).

Women under 35 with breast cancer: Association between age and breast screening (Preliminary results).

Danitza Andaur-Cisterna¹, Carlos Kilchemann-Fuentes²

¹Matrona, Universidad Mayor y Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Chile.

²Matrón, Universidad Mayor y Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Chile.

*Autor para correspondencia: danitza.andaaur@mayor.cl

RECIBIDO: 29 de Diciembre de 2021

APROBADO: 16 de Mayo de 2022



DOI: [10.22370/revmat.2.2022.3236](https://doi.org/10.22370/revmat.2.2022.3236)

EL AUTOR DECLARA NO TENER CONFLICTO DE INTERESES.

Palabras claves: *Cáncer de mama, Mujer joven, Tamizaje mamario.*

Key words: *Breast cancer, Young woman, Breast screening.*

Introducción: El 40% del total de cánceres en menores de 35 años corresponde a un cáncer de mama. El diagnóstico precoz depende del acceso oportuno al tamizaje y así disminuir el riesgo de pronósticos desfavorables.

Objetivo: Establecer asociación entre la edad del diagnóstico y los resultados del tamizaje mamario, en pacientes que ingresaron a la unidad de patología mamaria del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso durante el periodo 2018-2021

Diseño: Cuantitativo Analítico de Cohorte Retrospectivo abarcando al total de la población, categorizada en 3 grupos: Menores de 35 años; 35-55 años; mayores de 55 años. Se realizaron asociaciones entre variables cualitativas con la prueba estadística Chi², y análisis de varianza ANOVA en cuantitativas.

Resultados: Se incluyó al total de la población equivalente a 599 mujeres con cáncer de mama. De estas, 16 fueron diagnosticadas antes de los 35 años, identificando que el 100% (n=16) presentó hallazgos en el autoexamen de mama (AEM), comparado con el 68.12% (n=372) del grupo de mayor de 35 años (p=0,01).

Se determinó un riesgo relativo de presentar hallazgos en el AEM en menores 35 años de 1,42 (IC al 95% = 1,34-1,50; p=0,009)

Conclusión: El diagnóstico por autoexamen de mama es la principal causa para la realización de exámenes mamarios y derivación para tratamiento y no el hallazgo de alteraciones de la mama por tamizaje imagenológico.